



IRRIGOSKOOPIA

Patsiendi infoleht

Irrigoskoopia on seedetrakti alaosa radioloogiline uuring, mille käigus järk-järgult kontrastainet jämesoolde viies uurib arst patsiendi jämesoolt. See uuring võimaldab selgitada Teie kaebuste (alakoõhuvalu, vereeritus soolest) põhjuseid ja/või leida haiguslikke muutusi jämesooles.

Milline ettevalmistus on vajalik?

Uuringu läbiviimiseks peab Teie jämesool olema puhas. Soole puhastamiseks kasutatakse tavaliselt suu kaudu manustatavaid spetsiaalseid lahuseid või muid lahtistava toimega aineid. Jälgige palun hoolikalt instruktsioone, mida arst ja õde Teile annavad.

8-10 tundi enne uuringut ei tohi süüa ega juua!

Kuidas uuringut teostatakse?

Irrigoskoopiat tehakse röntgenkabinetis. Uuring kestab tavaliselt 30-60 minutit. Uuringu ajal lamate vasakul küljel. Päraku kaudu viiakse soolde kontrastainet sisaldavat vedelikku. Selleks, et kontrastaine kataks jämesoole kõiki seinu, peate aeg-ajalt pöörama vasakule ja paremale küljele. Uuringu ajal võite tunda vähest ebamugavustunnet, mis on tingitud soole venitusest.

Uuringujärgsetel päevadel võib Teie rooja värvus muutuda valkjamaks, mis on tingitud baariumit sisaldavast kontrastainest. See on ohutu.

Kõhukinnisuse vältimiseks on soovitatav kahel järgneval päeval juua rohkelt vedelikku.